

# EL GÉNERO *SIEVEKINGIA* EN COLOMBIA Y *SIEVEKINGIA FIMBRIATA* UNA ESPECIE REPORTADA POR PRIMERA VEZ PARA COLOMBIA

Francisco Villegas V.\*

El género *Sievekingia* pertenece a la subtribu *Stanhopeinae* y consta de un número mediano de especies, 12 a 14 en total. Están presentes en Centro y Suramérica con foco de distribución en Colombia y Panamá.

Hasta la fecha la literatura reporta 5 especies para Colombia: *S. colombiana*, *S. filifera*, *S. marsupialis*, *S. reichembachiana* y *S. suavis*.

En este artículo se reporta la aparición por primera vez en Colombia de *Sievekingia fimbriata*, completando seis el número de especies del género en el país.

Este género se caracteriza por plantas pequeñas a medianas con bulbos redondeados o piriformes surcados longitudinalmente con una hoja terminal. Sus inflorescencias son compactas de pocas o muchas flores agrupadas en ramilletes generalmente cortos. Las plantas en estado natural o bajo condiciones de cultivo aceptables, producen inflorescencias profusamente durante varios períodos del año. Ellas se distinguen de plantas juveniles de otros géneros como *Gongora* y *Stanhopea* por la precocidad para florecer y por los restos secos de las inflorescencias cortas que permanecen por muchos meses en la planta. Algunas de las especies colombianas tienen hojas con textura escamosa en el haz o en el envés.

## ***SIEVEKINGIA COLOMBIANA*** Garay

Se distingue por el labelo trilobulado, la base de forma cuneiforme y presenta cinco dientes o quillas en la base y un callo bidentado en el

---

\* Socio Sociedad Colombiana de Orquideología. [orquifoll@une.net.co](mailto:orquifoll@une.net.co).

centro del labelo. Sus flores son medianas, 3 a 4 cms. de diámetro, su color es amarillo a crema con el labelo anaranjado. Es una de las especies menos vistosas, de pocas flores 2 a 4 por inflorescencia y se ha reportado en el Chocó en las vertientes de la cordillera occidental hacia el Pacífico. (Figura 1)

### ***SIEVEKINGIA FILIFERA*** Dressler

Una de las especies más rara y escasa en Colombia de donde es endémica.

Descrita en 1.976 por R. Dressler. Sólo se ha colectado pocas veces y siempre una o dos plantas, su procedencia está en el noroeste y norte de Antioquia en los municipios de Amalfi, Anorí, Briceño y Urrao.

La característica principal de sus flores es la columna delgada sin alas, el labelo trilobulado con la presencia de 8 a 9 apéndices filamentosos en la base y adelante un callo triangular, bidentado. Su coloración es amarilla con manchas vinotinto en el labelo. (Figura 2)

### ***SIEVEKINGIA MARSUPIALIS*** Dodson

Hasta hace poco fue llamada *S. herrenhusana*, se encuentra en el sur del país en los departamentos de Caquetá y Putumayo.

Es la especie que posee flores más grandes de las presentes del género en Colombia. Su labelo es trilobulado con nueve apéndices filamentosos en la base y adelante un callo bidentado. Las inflorescencias de esta especie son copiosas y en conjunto pueden llenar la base de la canasta donde están creciendo, el color de las flores individuales es amarillo pálido y es una de las especies que no tiene fimbriados los bordes del labelo, sépalos y pétalos. (Figura 3)

